

ESPERMOCULTIVO CON ORINA

Estimado paciente:

Para realizar las muestras de este análisis, por favor, dedique unos minutos a leer con atención las siguientes instrucciones.

Antes de la recolección

- De 3 a 5 días previos, **no mantener relaciones sexuales**.
- Durante las 72 horas previas, **no tomar antibióticos**.

¿Qué usar?

- 3 (tres) frascos estériles comprados en farmacia, los que debe rotular ("orina 1.^{er} chorro", "orina chorro medio", "esperma").
- Hisopo de algodón provisto por el laboratorio.
- Medio de transporte Stuart provisto por el laboratorio.
- Jabón nuevo.

¿Cómo hacer la recolección?

1. Al levantarse, antes de orinar, higienice su pene retrayendo el prepucio, primero con agua; luego, use el jabón nuevo y, por último, enjuague bien con agua.
2. Saque el hisopo del tubo, retraiga el prepucio y pase el hisopo provisto alrededor de la zona prepucial.
3. Recoloque el hisopo en el tubo de transporte Stuart provisto y ciérrelo bien.
4. Retraiga otra vez el prepucio y orine un primer chorro (10 ml equivalentes a 1 cm de altura en un frasco de 8 cm de diámetro) en el frasco rotulado "orina 1.^{er} chorro".
5. Siga orinando en el inodoro y reserve otra porción para el frasco rotulado "orina chorro medio". Mantenga esta muestra en la heladera.
6. Obtenga la muestra de esperma total **completa** por masturbación dentro del frasco estéril.
No utilice preservativo.

¡Atención!

Para no alterar el resultado:

- Envíe las muestras (hisopado, orinas y esperma) al laboratorio en el día.
- Solamente la muestra de orina de chorro medio (paso 5) debe remitirse **refrigerada**.



Complete los siguientes datos

Apellido y nombre:

Fecha y hora de recolección:

Cuántos días de abstinencia sexual previa a la muestra:

Motivo del estudio:

Qué medicación está tomando:

Qué tratamiento está realizando:

Si tiene dudas, antes de seguir paso a paso las indicaciones detalladas, por favor, comuníquese con el laboratorio.