



FLUJO VAGINAL Y MOCO CERVICAL

Estimada paciente:

Para realizar las muestras de este análisis, por favor, dedique unos minutos a leer con atención las siguientes instrucciones.

Antes de la recolección

- Solicitar un **turno** en el laboratorio (excepto embarazadas a partir de la semana 35 de gestación).
- Dejar pasar por lo menos 5 días desde el último día de la menstruación.
- Durante las **72 horas previas** a la recolección: no ingerir antibióticos, ni tener relaciones sexuales, ni colocarse ningún tipo de cremas vaginales, talco, óvulos, desodorantes.
- No tomar la muestra de flujo **dentro de las 72 hs** de haberse hecho una **Colposcopia**
- Concurrir al laboratorio **sin higiene vaginal** desde la noche anterior (evitar el uso del bidet y no realizar duchas vaginales).

NOTA: Consulte por tomas de muestras para niña prepúber y púber.

Cultivo para Estreptococo grupo B en Hisopado perianal

Seguir las instrucciones para la recolección de Flujo y recuerde no utilizar desodorantes, cremas, ni talco en la zona perianal. No realizar higiene genital profunda con bidet durante el día en que se realizará el estudio.

Complete sus datos

Nombre y apellido:

F. U. M. (fecha de su última menstruación):

Presenta flujo SÍ NO

Presenta prurito (picazón) SÍ NO

DIU SÍ NO

Si tiene dudas, antes de seguir paso a paso las indicaciones detalladas, por favor, comuníquese con el laboratorio.